

Kürzel (Parameter)	Referenzwert / -Bereich	Einheit	Bemerkung	Ziffer EBM	Ziffer GOÄ	Methode → benötigtes Material
Schilddrüsenparameter						
FT3 (Freies Trijodthyronin)	3,1 – 7,0	pmol/l	Referenzbereich	32321	4022	LIA/RIA → Serum
FT4 (Freies Thyroxin)	8,0 - 17,0	pg/ml	Referenzbereich	32320	4023	LIA/RIA → Serum
	< 25	pg/ml	unter Therapie			
TG (hTG Thyreoglobulin) → FAS = 0,5 ng/mL	< 2	ng/ml	Z.n. ablativer Therapie	32420	4070	FIA/RIA → Serum
	< 20	ng/ml	ausreichend suppressierte Therapie, keine Wachstumstendenz			
	> 40	ng/ml	unzureichend therapiert, Jodmangel			
	> 70	ng/ml	Wachstumstendenz, V.a. Malignität			
TGS (hTG-sensitiv) → FAS = 0,15 ng/mL	< 0,2	ng/ml	Cut-off Wert	32420	4070	FIA/RIA → Serum
TPOC (aTPO / MAK Thyreoperoxidase-AK)	< 60	U/ml	Referenzbereich	32502	3871	LIA/RIA → Serum
TAKC (aTG / TAK Thyreoglobulin-AK)	< 60	U/ml	Referenzbereich	32502	3876	LIA/RIA → Serum
TRAK (TSH-Rezeptor-AK)	< 1,0	U/l	negativ	32508	3879	RIA → Serum
	1 – 1,5	U/l	ggf. Kontrollbedarf			
	> 1,5	U/l	positiv			
TSH basal (Thyreostimulierendes-Hormon)	0,3 – 3,7	µU/ml	Referenzbereich bei Erwachsenen	32101	4030	LIA/RIA → Serum
TRH-Test → nach Gabe v. TRH	2,0 – 25,0	µU/ml	Referenzbereich			LIA/RIA → Serum
Anämie						
FER (Ferritin)	20 – 167	ng/ml	Referenzbereich Frau	32325	3742	LIA/RIA → Serum
	33 – 266	ng/ml	Referenzbereich Mann			
FOL (Folsäure, Vit.B9)	3,1 – 19,9	ng/ml	Referenzbereich	32372	4140	LIA/RIA → Serum gefroren
VB12 (Vitamin B12)	211 – 911	pg/ml	Referenzbereich	32373	4140	LIA/RIA → Serum Lichtschutz, gefroren
	170 – 211	pg/ml	ggf. Kontrollbedarf			
Tumormarker						
AFP (Alpha-Fetoprotein)	< 10	ng/ml	Referenzbereich	32350	3743	LIA/RIA → Serum
CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3)	< 32	U/ml	Referenzbereich	32391	3901	LIA/RIA → Serum
CA 19-9 (Cancer Antigen 19-9)	< 37	U/ml	Referenzbereich	32392	3902	LIA/RIA → Serum
CAL (hCT / Humanes Calcitonin)	< 15	pg/ml	Referenzbereich Frauen	32410	4047	LIA/RIA → Serum gefroren
	< 17	pg/ml	Referenzbereich Männer			
CEA (Carcino-Embryonic-Antigen)	< 2,5	ng/ml	Nichtraucher	32324	3905	LIA/RIA → Serum
	< 5	ng/ml	Raucher			
PSA ges. (Prostata-spez. Antigen)	< 4	ng/ml	Referenzbereich	32351	3908	LIA/RIA → Serum
	5 – 10	ng/ml	ggf. Kontrollbedarf			
	> 10	ng/ml	pathologisch			
Herzmarker						
HOM (Homocystein)	5,0 – 13,9	µmol/l	Referenzbereich	32318	4062	LIA/RIA → Serum
nBNP (N-terminales pro brain natriuretic peptide)	< 125	pg/ml	< 75 Jahre	32097	4069	LIA/RIA → Lithium-Heparin Plasma
	< 450	pg/ml	> 75 Jahre			

Kürzel (Parameter)	Referenzwert / -Bereich	Einheit	Bemerkung	Ziffer EBM	Ziffer GOÄ	Methode → benötigtes Material
Knochenstoffwechsel						
PTH (iPTH / Intaktes Parathormon)	18,5 – 88	pg/ml	Referenzbereich	32411	4056	LIA/RIA → Serum gefroren
VD25 (25-OH Vitamin D)	< 10	ng/ml	Vitamin D Mangel	32413	4138	LIA/RIA → Serum
	10 – 30	ng/ml	Versorgung unzureichend			
	30 – 100	ng/ml	Versorgung ausreichend			
Spurenelemente						
SE (Selen)	50 – 120	µg/l	Referenzbereich	32280	4134	ICP-MS → Serum
Hormone						
DHEA-S (Dehydro-Epi-Androsteron-Sulfat)	Auf Anfrage	µg/dl	Alters- u. geschlechtsabhängig	32369	4038	LIA/RIA → Serum
E2 (Estradiol)	19,5 – 144,2	pg/ml	Follikelphase	32356	4039	LIA/RIA → Serum
	63,9 – 356,7	pg/ml	Periovulation			
	55,8 – 214,2	pg/ml	Luteale Phase			
	< 32,2	pg/ml	Postmenopause			
	< 39,8	pg/ml	Referenzbereich Mann			
FSH (Follikelstimulierendes Hormon)	2,5 – 10,2	U/l	Follikelphase	32353	4021	LIA/RIA → Serum
	3,4 – 33,4	U/l	Periovulation			
	1,5 – 9,1	U/l	Luteale Phase			
	< 0,3	U/l	Schwangerschaft			
	23 – 116,3	U/l	Postmenopause			
	1,4 – 18,1	U/l	Referenzbereich Mann			
hCG (Humanes β-Choriongonadotropin)	< 6	U/l	Referenzbereich Frau	32352	4024	LIA/RIA → Serum
	< 2	U/l	Referenzbereich Mann			
LH (Luteinisierendes Hormon)	1,9 – 12,5	U/l	Follikelphase	32354	4026	LIA/RIA → Serum
	8,7 – 76,3	U/l	Periovulation			
	0,5 – 16,9	U/l	Luteale Phase			
	<1,5	U/l	Schwangerschaft			
	15,9 – 54,0	U/l	Postmenopause			
	0,7 – 5,6	U/l	Kontrazeptiva			
	1,5 – 9,3	U/l	Ref. Mann <70 Jahre			
	3,1 – 34,6	U/l	Ref. Mann >70 Jahre			
PROG (Progesteron)	<1,4	ng/ml	Follikelphase	32357	4040	LIA/RIA → Serum
	3,34 – 25,56	ng/ml	Luteale Phase			
	4,44 – 28,03	ng/ml	Mittlere Luteale Phase			
	< 0,73	ng/ml	Postmenopause			
	0,28 – 1,22	ng/ml	Referenzbereich Mann			
PROL (Prolaktin)	2,8 – 29,2	ng/ml	Referenzbereich Frau	32355	4041	LIA/RIA → Serum
	9,7 – 208,5	ng/ml	Schwangerschaft			
	1,8 – 20,3	ng/ml	Postmenopause			
	2,1 – 17,7	ng/ml	Referenzbereich Mann			
TSTII (Testosteron)	7 – 59	ng/dl	Referenzbereich Frau 12 – 59 Prämenopause < 7 – 49 Postmenopause	32358	4042	LIA/RIA → Serum
	165 – 753	ng/dl	Ref. Mann < 50 Jahre			
	86 – 788	ng/dl	Ref. Mann > 50 Jahre			
Infektion						
SARS-CoV-2 IgG	negativ	Kein spezifischer IgG-AK nachweisbar. Kein Hinweis auf durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion.			4404	ELISA → Serum
	grenzwertig	Spezifischer IgG-AK grenzwertig nachweisbar. Möglicher Hinweis auf durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion oder unspezifische Reaktion. Verlaufskontrolle empfohlen.				
	positiv	Spezifischer IgG-AK nachweisbar. Hinweis auf durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion.				

Abk.: AK = Antikörper, ELISA = Enzymimmunttest, FAS = funktionelle Assaysensitivität, FIA = Fluoreszenz-Immunoassay, ICP-MS = induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie, LIA = Lumineszenz-Immunoassay, Ref. = Referenzbereich, RIA = Radio-Immunoassay, U = International Unit, V.a. = Verdacht auf, Z.n. = Zustand nach